

HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MENGKONSUMSI TABLET Fe DI BPS UMMU HANI KASONGAN BANTUL¹

INTISARI

Irdamardiana², Winda Irwanti³, Sumirah⁴

Latar Belakang : WHO melaporkan prevalensi ibu hamil dengan defisiensi besi sekitar 35-75%, sedangkan di Indonesia sekitar 40,1%. Di Provinsi DIY mencapai 73,9%, dan di Kabupaten Bantul sendiri sebesar 42,2%. Masih tingginya prevalensi ini dapat disebabkan kurang intensifnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya tablet Fe.

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu hamil dengan tingkat kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe di BPS Ummu Hani Kasongan Bantul.

Metode Penelitian : Deskriptif analitik dengan rancangan *Cross Sectional*. Populasi seluruh ibu hamil trimester II dan III. Teknik pengambilan sampel dengan *Purposive Sampling* jumlah sampel 30 ibu hamil.

Hasil Penelitian : Terdapat dua karakteristik ibu hamil yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe. Uji statistik *Kendal Tau* menunjukkan nilai sebesar 0,001 berdasarkan umur dan 0,004 berdasarkan pendidikan. Uji *Regresi Logistik* didapat nilai *p value* berdasarkan umur sebesar 0,003 dan pendidikan sebesar 0,335.

Kesimpulan : Karakteristik ibu hamil yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe adalah umur dan pendidikan. Uji *Regresi Logistik* didapatkan bahwa variabel yang paling berhubungan dengan kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet Fe adalah umur.

Kata Kunci : Ibu hamil, karakteristik, kepatuhan dan tablet Fe.

¹. Judul Karya Tulis Ilmiah

². Mahasiswa Prodi DIII Kebidanan STIKES Alma Ata Yogyakarta

³. Dosen STIKES Alma Ata Yogyakarta

⁴. Dosen STIKES Alma Ata Yogyakarta